

अदरक



किस्म	बुआई का समय	दूरी	बीज दर
नदिया एवं लोकल	15-31 मई	30 x 20 सें. मी.	18 से 20 क्विं./ हे., गांठ का वजन - 20 से 25 ग्राम

बीज उपचार	खाद एवं उर्वरक (प्रति हे.)	खरपतवार नियंत्रण	सिंचाई
मेटालेक्सिल मैंकोजेब (रीडोमिल एम. जेड.) - 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी + स्ट्रेप्टोसाईक्लिन - 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के घोल में बीजोपचारित करें।	कम्पोस्ट - 250-300 क्विं./ हे. नेत्रजन - 80-100 कि./ हे. फॉस्फोरस - 50 कि./ हे. पोटाश - 80 कि./ हे. जिंकसल्फेट - 20-25 कि./ हे. फेरस सल्फेट - 15 कि./ हे. कॉपर - 15 कि./ हे.	3 से 4 बार निकाई - गुड़ाई	अक्टूबर - नवम्बर माह में वर्षा नहीं होने पर 3-4 सिंचाई

कीट एवं नियंत्रण	रोग एवं नियंत्रण	खुदाई	उपज
तना छेदक कीट : नियंत्रण - क्विनॉलफॉस (फ्लैश) - 1.0 मि०ली० प्रति लीटर पानी के घोल का आवश्यकतानुसार छिड़काव।	गट्ठी सड़न रोग : मेटालेक्सिल मैंकोजेब (रीडोमिल एम० जेड०) - 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का 2-3 बार मिट्टी को सिंचित करें। जीवाणु मुरझान रोग : स्ट्रेप्टोसाईक्लिन या स्ट्रेप्टोमाईसीन या एग्रोमाईसीन - 1 ग्राम प्रति तीन लीटर पानी के घोल का 2-3 बार मिट्टी को सिंचित करें।	पत्तियाँ सूखने के बाद।	150-200 क्विं०/हे०